

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
PM/DL - E/1/2020	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronowirusem 2019-n Cov SARS-Co V -2”</b>	Strona 1 z 6  Data obowiązywania: <b>09-03-2020</b>

**SPIS TREŚCI**



1.	Cel procedury	strona 2
2.	Przedmiot procedury	strona 2
3.	Zakres stosowania	strona 2
4.	Sposób postępowania	strona 2 - 4
5.	Odpowiedzialność i kompetencje	strona 5
6.	Dokumenty związane z procedurą	strona 5
7.	Kontrola przebiegu procedury	strona 5
8.	Załączniki	strona 6,7
9.	Rozdzielnik procedury	strona 5

Kopia nr

Własność:

--	--

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy oraz kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds. jakości

	<b>DZIAŁ</b>	<b>DATA</b>	<b>NAZWISKO</b>	<b>PODPIS</b>
<i>OPRACOWAŁ</i>	Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego	9.03.2020	Babicz Zofia	<b>Szpital Murcki Sp. z o.o.</b> <b>PIELĘGNIARKA SPECJALISTKA</b> w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego  mgr Zofia Babicz -5-
<i>ZAOPINIOWAŁ</i>	Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych	09.03.2020	ANIDA GROSICKA	dr n. med. Anida Grosicka specjalista reumatolog specjalista chorób wewnętrznych lekka epidemiologii 07.03.2020 
<i>SPRAWDZIŁ</i>	Pełnomocnik ds. Jakości	5.03.2020	Chyla	<b>Szpital Murcki Sp. z o.o.</b> <b>NACZELNA PIELĘGNIARKA</b> mgr Bożena Chyla -3-
<i>ZATWIERDZIŁ</i>	Prezes Szpitala			<b>Szpital Murcki Sp. z o.o.</b> <b>PREZES ZARZĄDU</b> mgr inż. Krzysztof Zaczek -1-

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-n Cov SARS-Co V-2”</b>	Strona 2 z 6
PM/DL - E/1/2020		Data obowiązywania: 30-03-2020

**1.Cel procedur:** Wczesne wykrywanie przypadków podejrzenia, zapobieganie rozprzestrzeniania i minimalizacja ryzyka zakażenia koronawirusem.

**2.Przedmiot procedury:** Schemat postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia/zachorowania na chorobę wysoce zakaźną.

**3. Zakres stosowania:** Procedura obowiązuje personel Szpitala.

**4. Sposób postępowania :**

Postępowanie z pacjentem

**UWAGA! ZADANIE PERSONELU PIERWSZEGO KONTAKTU !**

Zapewnij szybką segregację i izolację pacjentów z objawami podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV lub innych grypopodobnych infekcji dróg oddechowych:

- wywieść informację, że pacjent z objawami grypopodobnymi który ma uzasadnione podejrzenie, że mógł mieć kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2, tzn. w okresie ostatnich 14 dni był bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) lub pracował lub przebywał jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARSCoV-2, lub zgłaszający się podróżował/przebywał w regionie, w którym utrzymuje się transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 MA BEZPOŚRĘDNIO ZGŁOSIĆ SIĘ DO OKIENKA REJESTRACJI POZA KOLEJNOŚCIĄ, USTA, NOS ZASŁONIĆ PRZYNAJMNIEJ CHUSTECZKĄ JEDNORAZOWĄ (LUB MASECZKĄ, JEŚLI PACJENT POSIADA) I POINFORMOWAĆ NATYCHMIAST PERSONEL O SWOIM STANIE ZDROWIA.
- umieścić informację, że szpital posiada całodobowy telefoniczny punkt informacyjny dla pacjentów w przypadku wątpliwości co do postępowania na wypadek podejrzenia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 lub odrębny punkt przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia,
- umieścić preparat do dezynfekcji rąk w newralgicznych miejscach i monitoruj jego zawartość;
- umieścić w newralgicznych miejscach kosze na odpady medyczne zakaźne (18 01 03\*)

Ponad to, jeśli zobaczysz pacjenta z objawami infekcji (pamiętaj - może to być pacjent urazowy), który siedzi wśród innych pacjentów na poczekalni podaj mu maseczkę do założenia (może być maska chirurgiczna, musi być zmieniana co 1 godzinę i wyrzucana jak odpad medyczny zakaźny 18 01 03, odizoluj chorego od bezpośredniego kontaktu z innymi pacjentami (zachowując zasady własnego bezpieczeństwa epidemiologicznego tj. załóż co najmniej maseczkę i osłonę na oczy, unikaj bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz), zapytaj pacjenta o:

- obecność objawów infekcji (czy ma gorączkę 38°C lub wyżej, kaszel, duszność, pacjent może zgłaszać też biegunkę, nudności, wymioty, zapalenie spojówek),
- historię podróży do obszarów, w których występuje transmisja 2019-nCoV,
- kontakt z możliwymi pacjentami zakażonymi 2019-nCoV,

Po zebraniu skróconego wywiadu, jeżeli potwierdzi się możliwość zakażenia koronawirusem (lub nie możesz tego wykluczyć) - izoluj pacjenta w wyznaczonym pomieszczeniu do izolacji zakażeń przenoszonych drogą powietrzno - kropelkową.

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
PM/DL - E/1/2020	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-n Cov SARS-Co V-2”</b>	Strona 3 z 6  Data obowiązywania: 23-03-2020

**ZASADY POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA SARS CoV-2,  
ZE WSPÓLISTNIEJĄCYM URAZEM.**

Obowiązują zasady postępowania epidemiologicznego jak w przypadku pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 bez urazu— proritet — chronić siebie, personel, oraz osoby przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

**PACJENT Z URAZEM LEKKIM**

- zaopatrzenie pacjenta w pokoju izolacji z zachowaniem procedury izolacji i postępować dalej jak w procedurze, zgodnie z kryteriami epidemiologicznej definicji przypadku.

**PACJENT Z URAZEM CIĘŻKIM**

- zaopatrzyć pacjenta wstępnie w pokoju izolacji i jeśli pacjent nadaje się do transportu - przekazać go do szpitala z oddziałem obserwacyjno-zakaźnym i oddziałem chirurgii informując o urazie.

**Przekazanie pacjenta do oddziału obserwacyjno-zakaźnego**

**1. Powiadom telefonicznie:**

- Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o przypadku podejrzenia zakażenia na nr alarmowy.
- Ustal miejsce przewiezienia pacjenta do oddziału obserwacyjno — zakaźnego zał.nr 3 - jeśli jest problem z ustaleniem miejsca w oddziale obserwacyjno — skontaktuj się z: wojewódzkim koordynatorem medycznym  
tel. całodobowy 32/20-77-100  
lub  
wojewódzkim wydziałem zarządzania kryzysowego - dyżur,  
telefony całodobowe: 32/25-65-601, 32/25-52-195, 32/20-77-101
- Zorganizuj transport sanitarny celem przewiezienia pacjenta do oddziału zakaźnego - transportem sanitarnym szpitala lub wyznaczoną karetką ZRM (jeśli jest wyznaczona) - przez Pogotowie Ratunkowe (ZRM) jeśli jest to stan zagrożenia życia.

**ZASADY TRANSPORTU PACJENTA:**

- poinformuj transport o zagrożeniu epidemiologicznym związanym z kontaktem z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2,
- pacjenta wyposaż w maskę,
- osoby uczestniczące w transporcie (jeśli jest to transport sanitarny szpitala) muszą być wyposażone w ŚOI,

2. Pacjent opuszcza pokój izolacji w warunkach izolacji powietrzno-oddechowej.

3. Personel opuszcza pokój izolacji (zgodnie z zasadami zdejmowania ŚOI).

**Czynności pozostałe**

Lekarz, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przesyła potwierdzenie przypadku podejrzenia / zachorowania na druku ZLK 1, zgodnie z obowiązującą procedurą Osoby mające kontakt z pacjentem podlegają nadzorowi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
PM/DL - E/1/2020	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronowirusem 2019-n Cov SARS-Co V -2”</b>	Strona 4 z 6  Data obowiązywania: 23 03 2020

**Postępowanie z otoczeniem pacjenta (zasady obowiązują również w pomieszczeniu karetki).**

Po opuszczeniu pomieszczenia przez pacjenta nie wchodzić do pomieszczenia bez ŚOI. Obowiązują zasady gruntownej dezynfekcji pomieszczenia zgodnie z procedurą i Planem Higieny Szpitalnej.

**Zalecenia dla personelu transportującego odpady wysoce zakaźne i bieliznę skażoną:**

- do transportu odpadów medycznych wysoce zakaźnych i bielizny skażonej zakładać ŚOI
- . zachować szczególną, ostrożność przy transporcie aby nie doszło do otwarcia pojemników. Nie rzucać pojemnikami. Jeśli pojemnik jest ciężki-wykonywał czynności transportowe w dwie osoby.
  - . po wykonaniu transportu wykonać dezynfekcję wózków transportowych, zdjąć odzież ochronną, zgodnie z procedurą (traktować ją jak odpad medyczny, zakaźny 18 0103'), zdezynfekować ręce.
  - . po zabraniu odpadów i bielizny z magazynów wózek oraz powierzchnie magazynu zdezynfekować preparatem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurę.

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
PM/DL - E/1/2020	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronowirusem 2019-n Cov SARS-Co V -2”</b>	Strona 5 z 6  Data obowiązywania: 19 09 2020

#### 4. **Odpowiedzialność i kompetencje:**

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Ordynator oddziału, Kierownik Poradni.

#### 5. **Dokumenty związane z procedurą:**

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

#### 6. **Kontrola przebiegu procedury:**

Dyrektor ds. Lecznictwa

#### 7. **Załączniki**

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie pracowników.

#### 8. **Rozdzielnik procedur**

- Egzemplarz nr „1” - Pełnomocnik ds Zarządzania Jakością.
- Egzemplarz nr „2”- Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego.
- Egzemplarz nr kolejny wg rozdzielnika dostępnego u Pełnomocnika.

<b>SZPITAL MURCKI Sp. z o.o. W KATOWICACH ul. SOKOŁOWSKIEGO 2 40 – 749 KATOWICE</b>	<b>KSIĘGA STANDARDÓW, PROCEDUR I INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA</b>	Wydanie I
PM/DL - E/1/2020	<b>„PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŻNEJ: podejrzenia zakażenia koronowirusem 2019-n Cov SARS-Co V-2”</b>	Strona 6 z 6  Data obowiązywania: 03-03-2020

Załącznik Nr 1

## OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW

.....  
( komórka organizacyjna Szpitala – pieczęć )

**Oświadczam, że zapoznałam/ lem się z treścią Procedury  
postępowania .....**

L.p.	Nazwisko i imię	Stanowisko	Data	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Załącznik Nr 2

## INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### ZESTAW PEŁNY- Z KOMBINEZONEM BIOMEDYCZNYM

Kolejność ZAKŁADANIA, zestawu pełnego:

- . wyjąć z kieszeni zbędne przedmioty, usunąć biżuterię, zegarki itp.
- . usiąść na krześle, zdjąć obuwie,
- . ostrożnie umieścić nogi w nogawkach kombinezonu, założyć buty, założyć ochraniacze na buty,
- . wstać, podciągnąć kombinezon do pasa, umieścić ręce w rękawach i naciągnąć kombinezon na ramiona,
- . założyć maskę, okulary lub gogle (jeśli w użyciu są przyłbice zakładać je po naciągnięciu na głowę kaptura.),
- . naciągnąć kaptur na głowę (założyć przyłbicę),
- . zasunąć kombinezon do samej góry,
- . założyć parę rękawic zakrywając nadgarstek oraz rękawy kombinezonu.

Kolejność ZDEJMOWANIA, zestawu pełnego:

- . ŚOI - za wyjątkiem maseczki ! - zdejmować przed opuszczeniem pokoju izolacji lub obszaru opieki, najlepiej w odległości ok. 2 m od pacjenta (jeżeli pacjent jest nadal w sali izolacji) lub w śluzie (traktowanej jako brudna), oddzielonej drzwiami od pokoju izolacji, po ich zamknięciu i wyrzucać do kosza na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03.
- . podczas zdejmowania ŚOI zachować szczególną ostrożność - nie dopuścić do zanieczyszczenia krzyżowego między skażoną powierzchnią ŚOI a skórą, włosami, nie trzepać, nie wzniecać pyłu, bioaerozolu,
- . nie zdejmując rękawic zdjąć przyłbicę (jeśli używana - jednorazową umieścić w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03., jeśli jest wielorazowa - wrzucić do pojemnika na skażony drobny sprzęt), powoli odchylić kaptur do tyłu uważając aby nie dotknąć głowy, włosów, twarzy,
- . umieścić obie ręce za plecami i pociągnąć za rękawy aż do całkowitego ich zdjęcia,
- . zdjąć ochraniacze na buty, zsunąć kombinezon do końca (uważać aby nie skazić spodniej odzieży),
- . umieścić ostrożnie ochraniacze na buty i kombinezon w koszu na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03.
- . zdjąć rękawice (umieścić je w koszu na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03 zdezynfekować ręce,
- . zdjąć ostrożnie okulary/gogle (jeśli używane) nie dotykając eksponowanej (przedniej) części tych elementów (czaszy maski, okularów), umieścić je w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03. lub jeśli okulary/gogle są wielorazowe - wrzucić do pojemnika na drobny sprzęt skażony, ponownie zdezynfekować ręce,
- . zdjąć maskę (po wyjściu z pokoju izolacji, można w śluzie brudnej) - umieścić ją w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03, przeprowadzić kolejną dezynfekcję rąk.

## ZESTAW UPROSZCZONY - Z FARTUCHEM JEDNORAZOWYM

Kolejność ZAKŁADANIA, zestawu uproszczonego:

- wyjąć z kieszeni zbędne przedmioty, usunąć biżuterię, zegarki itp.
- założyć zewnętrzny jednorazowy fartuch ochronny oraz nienasiąkliwe fartuch ochronny, ochraniacze na nogi,
- założyć maskę, okulary/gogle (jeśli w użyciu),
- założyć czepek ochronny, na czepek założyć przyłbicę (jeśli są w użyciu),
- założyć parę rękawic.

Kolejność ZDEJMOWANIA, zestawu uproszczonego:

- ŚOI- za wyjątkiem maseczki ! - zdejmować przed opuszczeniem pokoju izolacji lub obszaru opieki, najlepiej w odległości ok. 2 m od pacjenta (jeżeli pacjent jest nadal w sali izolacji) lub w słuzie (traktowanej jako brudna), oddzielonej drzwiami od pokoju izolacji, po ich zamknięciu i wyrzucać do kosza na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03,
- podczas zdejmowania ŚOI zachować szczególną ostrożność - nie dopuścić do zanieczyszczenia krzyżowego między skażoną powierzchnią ŚOI a skórą, włosami, nie trzepać, nie wzniecać pyłu, bioaerozolu,
- nie zdejmując rękawic zdjąć przyłbicę, czepek i okulary lub gogle uważając aby nie dotknąć głowy, włosów, twarzy (czepek, jednorazową osłonę twarzy/oczu umieścić w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03, wielorazowe elementy - wrzucać do pojemnika na skażony drobny sprzęt),
- zdjąć foliowy fartuch nieprzemakalny (fartuch umieścić w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03)
- zdjąć jednorazowy fartuch ochronny, pociągnąć za rękawy aż do całkowitego ich zdjęcia (fartuch umieścić w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03)
- zdjąć ochraniacze na buty (ochraniacze umieścić w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03.)
- zdjąć parę rękawic (umieścić je w pojemniku na odpady wysoce zakaźne 18 01 03), zdezynfekować ręce
- zdjąć maskę (po wyjściu z pokoju izolacji, można w słuzie brudnej) - umieścić ją w pojemniku na odpady medyczne wysoce zakaźne 18 01 03, przeprowadzić kolejną dezynfekcję rąk.